

1. Dörrobstmotte (*Plodia interpunctella*)

Spannweite ca. 20 mm. Flügelspitzen kupferrot. Das Weibchen legt unter günstigen Verhältnissen bis zu 600 Eier pro Jahr. Entwicklungsdauer je nach Bedingungen meist 1-2 Monate. Raupe ca. 16 mm lang, weiß-rosa. Kotkrümel und Nahrungsmittel werden zu Klumpen zusammengesponnen. Fraß an Dörrobst, Süßwaren, Nüssen, Getreide und Samereien, Backwaren, etc.



2. Mehlmotte (*Ephestia kuehniella*)

Spannweite ca. 25 mm. Vorderflügel silbrig- bis braun-grau mit gezackten, dunkelbraunen Querbändern. Hinterflügel einfarbig hell. Ein Weibchen kann bis um die 500 Eier im Jahr ablegen. Entwicklungsdauer ca. 6-18 Wochen. Raupe ca. 20 mm lang, rötlich, grünlich oder weiß. Nahrungsmittel werden verschmutzt, versponnen und erhalten einen üblen Geschmack. Durch Gespinste entstehen Mehlzöpfe.



3. Speicher-/Heu- oder Kakaomotte (*Ephestia elutella*)

Spannweite ca. 20 mm. Vorderflügel grau-hellbraun mit dunkler, gewellter Querbänderung. Hinterflügel hellgrau-hellbraun. 200-300 Eier – Entwicklungsdauer etwa 2-7 Monate, wie bei allen Motten stark Temperatur abhängig. Raupe ca. 16 mm lang, gelblich-weiß bis rötlich. Befallen werden insbesondere Kakaoprodukte und Süßwaren, Getreide, Ölsaaten, Nüsse, Trockenfrüchte, aber auch Heu und Stroh.



4. Tropische Speichermotte/Dattelmotte (*Ephestia cautella*)

Spannweite ca. 20 mm. Vorderflügel graubraun gefleckt mit dunklen Querbändern. Hinterflügel hellgrau-hellbraun mit dunklem Flügelrand. Ca. 300 Eier – Entwicklungsdauer ca. 1 Monat. Raupe ca. 16 mm lang, gelblich-weiß. Neben Kakaoprodukten werden bevorzugt Getreideprodukte befallen.



Aufgestellt am: Aktivieren Sie die Falle durch Abziehen der Schutzfolie.