

CELAFLOR® AMEISEN-MITTEL

Celaflor Ameisen-Mittel wirkt gründlich, schnell und lang anhaltend. Das staubfreie Granulat auf Zuckerbasis hat eine sehr gute Lockwirkung und wirkt sowohl über Fraß als auch über Kontakt des Gießmittels. Das Verfüttern an die Brut sichert eine gute Nestwirkung.

Anwendung: Zur Gießanwendung gegen Schwarze Gartenameise (*Lasius niger*), Erwachsene und Larven, um Gebäude auf harten Oberflächen, z.B. Terrassen, Innenhöfe, für den nicht berufsmäßigen Verwender. Nach dem Verdünnen mit Wasser mit einer Gießkanne aufbringen (punktuelle Anwendung, Nest) - 20 g des Produkts in 1 Liter Wasser lösen.

Anwendungsbereich: Terrassen, Wege, am Haus



Dosierung:
20g pro Liter bzw.
100 g/5 l Wasser lösen,
0,5 l Brühe pro kleines Nest /
2 l Brühe pro großes Nest

Auf kleine Nester (< 1m²) 0,5 L pro Nest anwenden. Darf nur innerhalb einer Fläche von 1 m² um bzw. auf das Nest und auf Ameisenstraßen gegossen werden.

Auf große Nester (> 1 m²) 2 L pro Nest anwenden. Darf nur innerhalb einer Fläche von 1 m² um das Nest bzw. auf Ameisenstraßen gegossen werden.

Einmalige Anwendung - bis zu 1 Monat wirksam. Das Produkt enthält einen Bitterstoff. Ein gestrichener Esslöffel entspricht in etwa 10g.

Anwendungszeit: Bei Auftreten

Anweisungen für die Verwendung: Vor Gebrauch stets das Etikett oder die Gebrauchsanweisung lesen und alle Anweisungen befolgen. Einmalige Anwendung nur direkt auf den Haupteingang des Ameisennestes. Nicht bei Regen oder Wind anwenden. Um Nester unter Terrassen zu erreichen, das Produkt sorgfältig in Risse und Spalten oder zwischen Fugen von Fliesen gießen und ein Abfließen des Produkts vermeiden. Nur in Bereichen anwenden, die nicht überflutet oder nass werden können, d.h. die vor Regen, Überschwemmungen und Reinigungswasser geschützt sind. Auf einwandfreie Hygiene achten: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen und nach Gebrauch die Hände waschen. Jegliche Nahrungsquellen entfernen bzw. Zugang zu diesen verhindern. Der Köder muss für die Ameisen die Hautnahrungsquelle sein. Sollte der Befall trotz befolgter Gebrauchsanweisung andauern, einen Schädlingsbekämpfer hinzuziehen. Den Zulassungsinhaber benachrichtigen, falls die Behandlung nicht wirksam ist. Kontinuierliche Anwendung des Produkts vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder vom behandelten Bereich fernhalten, solange das Produkt nicht getrocknet ist. Weder unmittelbar auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken, noch auf Flächen oder Gegenständen anwenden, die möglicherweise direkt mit Nahrungs- oder Futtermitteln oder Getränken in Berührung kommen. Direkte Anwendung auf Pflanzen vermeiden, die als Nahrungs- oder Futtermittel verwendet werden. Nicht in Bereichen anwenden, die für Kleinkinder, Kinder, Haustiere oder andere Nichtzieltiere zugänglich sind, um ein Vergiftungsrisiko so weit wie möglich zu verringern. Nach dem Benutzen sicherstellen, dass keine Pfützen auf der behandelten Fläche zurückbleiben. Bei Anwendung auf empfindlichen Materialien zunächst Verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Kann in Einzelfällen zu meist vorübergehender Fleckenbildung führen.

Erste Hilfe: Bei Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen und zwischendurch das obere und untere Augenlid hochziehen. Eventuelle Kontaktlinsen überprüfen und entfernen. Mindestens 10 Minuten ununterbrochen spülen. Bei Auftreten einer Reizung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. **Bei Einatmen:** Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen und ihm diesen Behälter oder das Etikett zeigen. **Bei Hautkontakt:** Betroffene Haut mit viel Wasser spülen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Kleidung vor Wiederverwendung waschen und Schuhe vor dem erneuten Tragen gründlich reinigen. **Bei Einnahme:** Mund mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen und ihm diesen Behälter oder das Etikett zeigen. **Hinweis für den Arzt:** Symptomatisch behandeln. Wenn größere Mengen eingenommen oder eingeatmet wurden, sofort einen Giftspezialisten hinzuziehen.

1096/1463_CLP



Entsorgung: Ein nicht benutztes Produkt, seine Verpackung und alle sonstigen Abfälle unter Einhaltung der lokalen Vorschriften entsorgen. Das nicht benutzte Produkt weder in den Boden, in Wasserläufe, Rohre (Abflüsse, Toiletten usw.) noch in die Kanalisation entleeren. Gießkanne nach der Anwendung ausspülen und das Spülwasser auf den behandelten Bereich ausgießen.

Lagerung: Kühl und trocken aufbewahren.

Chargennummer/Verfallsdatum: siehe Aufdruck
Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate. Füllhöhe technisch bedingt.

Celaflor Ameisen-Mittel
Biozid – Haushaltsinsektizid
(Produktart 18: Insektizid)
Art der Formulierung:
Granulat



Achtung!

Wirkstoff:
0,21 g/kg (0,021 Gew.-%) Fipronil (techn.)
Zulassungsnummer: DE-0011558-18

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält (R)-p-Mentha-1-8-dien und p-Mentha-1,4(8)-dien. Kann allergische Reaktionen auslösen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter unter Einhaltung der lokalen Vorschriften entsorgen.



Zulassungsinhaber und Vertrieb:

Scott's Celaflor GmbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, D-55130 Mainz
Tel.: 01805 780300 (14 ct/Min. a. d. dt. Festnetz.
Max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetzen)
www.celaflor.de



Die beigelegten Geruchs- und Bitterstoffe führen dazu, das Produkt für Kinder und Haustiere unattraktiv zu machen und einer unbeabsichtigten Aufnahme entgegenzuwirken.

Inhalt:

100g netto

