

## STRUBAL CELAFLOR SCHÄDLINGSFREI CAREO SPRAY

ist ein gebrauchsfertiges, breit wirksames Spray zur Anwendung an Zierpflanzen. Das Spray bekämpft saugende und beißende Schädlinge wie Blattläuse, Thripse, Weiße Fliege, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben sowie Käfer, Raupen (inkl. Buchsbaumzünsler), Minierer u.a.. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien bekämpft.

- **Sofort-Wirkung bei Kontakt**
- **Vollsystemische Wirkung:** Erfasst auch versteckt sitzende Insekten



Blatt besprühen → Verbreitung des Insektizids über den Saftstrom in der ganzen Pflanze.

Insekten werden auch dann bekämpft, wenn sie beim Besprühen nicht getroffen werden.

- **Dauerwirkung:** Wirkt bis zu 2 Wochen
- **Nicht bienengefährlich**



**Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln!** Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, bei Spinnmilben auch die Blattunterseiten. Die systemische Wirkung gewährleistet auch die Bekämpfung versteckt sitzender Schädlinge. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen nachbehandeln.

Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Anwendungsbereich	Schädlinge	Anwendungsmenge	Anwendungszzeit
Zierpflanzen, Ziergehölze, (Freiland)	Beißende und saugende Insekten, Schildlausarten, Schmierläuse, Weiße Fliege	Behandeln bis zur sichtbaren Benetzung; Max. Zahl der Behandlungen 4 für die Kultur bzw. je	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen
Zierpflanzen, (Gewächshaus)	Beißende und saugende Insekten, Schildlaus, Schmierläuse, Weiße Fliegen, Spinnmilbe	Jahr jeweils im Abstand von 10 - 14 Tagen. Pflanzen aus 50 cm Abstand leicht einsprühen - auch die Blattunterseiten	
Zimmerpflanzen (Zimmer, Büroräume, Balkone)			

**Beißende Insekten** wie z.B. Käfer, Raupen, Minierer, Blattwespen, Gespinnstmotten, Wickler

**Saugende Insekten** wie z.B. Blatt- und Wollläuse, Thripse, Zikaden, u.a.

Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N).

Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen.

Insecticide Resistance Action Committee (IRAC): Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): 4A.

Insektizid, Akarizid, Aerosoldose  
Wirkstoff: 0,05 g/L (0,005 Gew-%) Acetamiprid

**Achtung! Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch/Verwendung des Produktes nicht essen, trinken oder rauchen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

### Zusätzliche Hinweise zur Anwendung

Strubal Cefalor Schädlingsfrei Careo Spray ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und -sorten unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen zu beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten, die aber nicht pflanzenschädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssternen und Kalanchoen. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonneneinstrahlung. Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch Unterlegen von Papier vor dem leicht öhlhaltigen Sprühnebel schützen. Vor Gebrauch Etikett lesen.

### Hinweise zum Schutz des Anwenders:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach Behandlung der Zimmerpflanzen den Raum verlassen und diesen nach etwa einer halben Stunde - durch Öffnen der Fenster - für ca. 30 Minuten durchlüften. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

### Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Arten *Aleochara bilineata* (Kurzflügelkäfer), *Pardosa amentata* und *palustris* (Wolfsinnen) eingestuft. Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen der Art *Poecilus cupreus* (Laufkäfer), *Chrysoperla carnea* (Florfliege) und *Thyridodroma tyri* (Raubmilbe) sowie als schädigend für *Coccinella septempunctata* (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

### Lagerung und Entsorgung

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Packungen mit eventuellen Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben. Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

### Zulassungsinhaber und Vertrieber:

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH  
Wilhelm-Theodor-Römhild-Straße 30, D-55130 Mainz  
Telefon: 01805/ 780300 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max 0,42 €/Min.  
aus dem Mobilfunk)



Chargennummer /  
Herstellungsdatum:  
siehe Aufdruck

650

Inhalt:

400 ml e3



Nr. 005983-00

1086/66080 - C/P

