

## CELAFLOR SCHÄDLINGSFREI CAREO SPRAY

ist ein gebrauchsfertiges, breit wirksames Spray zur Anwendung an Zierpflanzen. Ceflador Schädlingsfrei Careo Spray bekämpft saugende und beißende Schädlinge wie Blattläuse, Thripse, Weiße Fliege, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben sowie Käfer, Raupen (inkl. Buchsbaumzünsler), Minerier u.a.. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Einstadien bekämpft.

- **Sofort-Wirkung bei Kontakt**
- **Vollsystemische Wirkung:** Erfasst auch versteckt sitzende Insekten



Blatt besprühen → Verbreitung des Insektizids über den Saftstrom in der ganzen Pflanze  
Insekten werden auch dann bekämpft, wenn sie beim Besprühen nicht getroffen werden.

- **Dauerwirkung:** Wirkt bis zu 2 Wochen
- **Nicht bienengefährlich**



**Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln!** Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, bei Spinnmilben auch die Blattunterseiten. Die systemische Wirkung gewährleistet die Behandlung auch versteckt sitzender Schädlinge. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen nachbehandeln.

Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

**Zierpflanzen, Ziergehölze, Freiland**  
Beißende und saugende Insekten\*\*,  
Schildlausarten, Schmierläuse, Weiße Fliege

**Zierpflanzen, Gewächshaus**  
Beißende und saugende Insekten\*\*, Schildlausarten, Schmierläuse, Weiße Fliege, Spinnmilben

**Zimmerpflanzen (Zimmer, Büroräume, Balkon)**  
Beißende und saugende Insekten\*\*, Schildlausarten, Schmierläuse, Weiße Fliege, Spinnmilben

ANWENDUNGS-  
BEREICH

SCHÄDLINGE

ANWENDUNGS-  
MENGE

Behandeln bis zur sichtbaren Benetzung; Max. Zahl der Behandlungen 4 für die Kultur bzw. je Jahr jeweils im Abstand von 10 - 14 Tagen. Pflanzen aus 50cm Abstand leicht einsprühen - auch die Blattunterseiten

ANWENDUNGS-  
ZEIT

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen

\*Bei Weißer Fliege und Blattlaus. \*\*Beißende Insekten wie z.B. Käfer, Raupen, Minerier, Blattwespen, Gespinstmotten, Wickler  
Saugende Insekten wie z.B. Blatt- und Wollläuse, Thripse, Zikaden, u.a.

Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N).

Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen.

Insektizid: Akarizid, Aerosoldose  
Wirkstoff: 0,05 g/L (0,005 Gew-%) Acetamidiprid

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

### Zusätzliche Hinweise zur Anwendung

Ceflador Schädlingsfrei Careo Spray ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und -sorten unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen zu beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten, die aber nicht pflanzen-schädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssterne und Kalanchoen. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonneneinstrahlung. Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch Unterlegen von Papier vor dem leicht öhlhaltigen Sprühnebel schützen. Vor Gebrauch Etikett lesen.

### Hinweise zum Schutz des Anwenders:

Jedem unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach Behandlung der Zimmerpflanzen den Raum verlassen und diesen nach etwa einer halben Stunde - durch Öffnen der Fenster - für ca. 30 Minuten durchlüften. Achtung: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

### Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Arten *Aleochara bilineata* (Kurzflügelkäfer), *Pardosa amentata* und *palustris* (Wolfskribben) eingestuft. Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen der Art *Poecilus cupreus* (Laufkäfer), *Chrysoperla carnea* (Florfliege) und *Typhlodromus pyri* (Raubmilbe) sowie als schädigend für *Coccinella septempunctata* (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

### Lagerung und Entsorgung

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Packungen mit eventuellen Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben. Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Zulassungsinhaber und Vertrieb: *Scotts Ceflador* GmbH

Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, D-55130 Mainz

Telefon: 01805/ 780300

(0,14 €/Min aus dem deutschen

Festnetz, max 0,42 €/Min.

aus dem Mobilfunk)

Inhalt:

400 ml e


650



Nr. 005983-60

Chargennummer /  
Herstellungsdatum: siehe Aufdruck

1106/9608CLP



4 062700 866085