



Schädlingfrei CAREO® Combi-Stäbchen

Die Combi-Stäbchen schützen Zierpflanzen bei einfachster Anwendung bis zu 3 Monate lang vor Blattläusen, Weißer Fliege, Schildläusen, Thripsen (außer Frankliniella), Zikaden sowie Woll- und Schmierläusen.

Sie bieten eine Zweifachwirkung: Düngung für prächtiges Wachstum sowie gleichzeitige Bekämpfung von Schädlingen mit Langzeitschutz vor erneutem Befall. Substral Celflor Schädlingfrei Careo Combi-Stäbchen eignen sich auch zur Bekämpfung von Schädlingen an Hydrokulturen. Der Wirkstoff gelangt über die Wurzeln mit dem Saftstrom in alle oberirdischen Pflanzenteile und erreicht somit auch versteckt sitzende Schädlinge (systemische Wirkung).

Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.



Anwendung: Stäbchen vollständig von oben in den Wurzelballen stecken. Anschließend gut angießen. Bei Bedarf die Behandlung ca. 3 Monate später wiederholen. Zusätzliche Düngergaben erst ca. 3 Monate nach letzter Anwendung. Nach dem Umtopfen wird die Anwendung nach 3 Wochen empfohlen, wenn sich die Pflanzen an die frische Blumenerde gewöhnt haben.

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: gegen Saugende Insekten, Mottenschildläuse und Schilddäusen Arten an Topfpflanzen in Räumen, Wintergärten, Balkonen und Terrassen. Maximal 3 Anwendungen pro Kultur bzw. je Jahr. Anwendungen nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen.

Anwendungsbereich:	Schädlinge:	Anwendungsmenge:	Anwendung:
Zierpflanzenbau: Topfpflanzen in Räumen, Wintergärten, Balkonen und Terrassen	Saugende Insekten (Blattläuse, Blattflöhe, Zikaden, Thripse), Weiße Fliege, Schildläuse, Woll- und Schmierläuse	Generell: pro Liter Blumenerde, 14 cm Topf oder je Pflanze in der Balkonkiste 2 Stäbchen in die Erde stecken (bei Blattläusen reicht 1 Stäbchen). Bei Hydrokultursubstrat je Liter 1 Stäbchen bzw. bei Blattläusen ein 1/2 Stäbchen verwenden. Bei abweichenden Topfdurchmesser folgende Menge anwenden (Blattläuse: halbe Menge*): bis–11 cm I bis–14 cm I bis–17 cm I bis–20 cm *amtlich belegte Versuchsergebnisse	Max. 3 Anwendungen im Abstand von 56 Tagen in der Kultur bzw. je Jahr. Anwendung bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.

Für eine optimale Anwendung im Bereich Balkon- und Kübelpflanzen empfehlen wir unser Substral Celflor Schädlingfrei Careo Combi-Granulat.



Schädlingfrei Careo Combi-Stäbchen

Insektizid - Pflanzenstäbchen

Wirkstoff: 40 g/kg (4,0 Gew.-%) Acetamiprid
Achtung sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett

bereithalten. Verschüttete Mengen aufnehmen. Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Inhalt: 12,5 g netto

Zulassungsinhaber und Vertrieb in Deutschland:

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH

Wilhelm-Theodor-Römhild-Straße 30, D-55130 Mainz,

Telefon: 01805/ 780300 (0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz,

max. 0,42 €/Min. aus dem dt. Mobilfunk), www.liebedeinen Garten.de



Nr. 005632-00



EG-DÜNGEMITTEL:

NPK(Mg)-Dünger, der Formaldehydharstoff enthält, 10+7+9(+2)

Chloram

10,0% N Gesamtstickstoff

3,0% N Ammoniumstickstoff

1,0% N Carbamidstickstoff

6,0% N Formaldehydharstoff-N, 1,8% N in kaltem Wasser löslicher Formaldehydharstoff-N, 2,0% N in heißem Wasser löslicher Formaldehydharstoff-N

7,0% P₂O₅ neutral-anninitratlösliches und wasserlösliches Phosphat,

7,0% P₂O₅ wasserlösliches Phosphat

9,0% K₂O wasserlösliches Kaliumoxid

2,0% MgO wasserlösliches Magnesiumoxid



Die Careo Combi-Stäbchen ganz in die Erde stecken.



Der Wirkstoff gelangt über Wurzeln und Saftstrom in die Blätter und Blüten.



Der Wirkstoff bekämpft Blattläuse und andere saugende Schädlinge.

Pflanzenverträglichkeit: Vor einer Behandlung des gesamten Bestandes ist die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen in Vorversuchen zu prüfen. Der Beobachtungszeitraum sollte in etwa 5 bis 8 Tage betragen.

Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Mittel und dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Indirekte Einläufe über Hof und Straßenabläufe verhindern. Auf Grund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen werden Bienen (B3) und Populationen relevanter Nutzorganismen nicht gefährdet.

Hinweise zum Schutz des Anwenders:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

Sonstige Hinweise:

Bei vorhandenem Befall setzt die sichtbare Wirkung gegen Blattläuse bereits nach 1-3 Tagen, gegen Weiße Fliege nach 5-6 Tagen ein. In Abhängigkeit von der behandelten Pflanzenart beginnt die sichtbare Wirkung gegen andere Schädlinge nach ca. 2 Wochen.

Schädlingfrei Careo Combi-Stäbchen sind auch bei mehrmaliger Anwendung gut Pflanzenverträglich. Allerdings besteht bei zusätzlicher Düngung die Gefahr von Pflanzenschäden durch Überdüngung. Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln der selben Wirkstoffgruppe können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen zu vorbeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

Erste Hilfe:

Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen und Etikett und Verpackung vorzeigen.

Lagerung:

Kühl und trocken, frostfrei und nur in Originalpackung lagern. Leere Faltschachtel der Wertstoffsammlung begeben. Da die Anwendung des Mittels ausserhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir keine Haftung nur für gleichbleibende der Qualität.

Inhalt: **20 Stäbchen**

Chargennr./Herstellungsdatum: siehe Aufdruck

1088/66850