



# SCHÄDLINGSFREI CAREO® COMBI-STÄBCHEN

Celaflor Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen schützen Zierpflanzen bei einfachster Anwendung bis zu 3 Monate lang vor Blattläusen, Weißer Fliege, Schildläusen, Thripsen (außer Franklioniella), Zikaden sowie Woll- und Schmierläusen.

Celaflor Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen bieten eine Zweifachwirkung: Düngung für prächtiges Wachstum, gleichzeitige Bekämpfung von Schädlingen sowie Langzeitschutz vor erneutem Befall. Celaflor Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen eignen sich auch zur Bekämpfung von Schädlingen an Hydrokulturen. Der Wirkstoff gelangt über die Wurzeln mit dem Saftstrom in alle oberirdischen Pflanzenteile

und erreicht somit auch versteckt sitzende Schädlinge (systemische Wirkung).

**Anwendung:** Stäbchen vollständig von oben in den Wurzelballen stecken. Anschließend gut angießen. Bei Bedarf die Behandlung ca. 3 Monate später wiederholen. Zusätzliche Düngergaben erst ca. 3 Monate nach letzter Anwendung. Nach dem Umtopfen wird die Anwendung nach 3 Wochen empfohlen, damit sich die Pflanzen an das neue Substrat gewöhnen können.

Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

Anwendungsbereich (Haus- und Kleingarten)	Schädlinge	Anwendung:
Zierpflanzenkulturen (Unter Glas, Büroräume, Wohnräume)	Blattläuse, Blattflöhe, Zikaden, Thrips, Weiße Fliege (Mottenschildlaus), Woll- und Schmierläuse, Schildläuse	2 Stäbchen pro Liter Erde. Stäbchen in Erde (Wurzelballen) stecken. Topfdurchmesser – Anzahl Stäbchen Ca. 11 cm = 1      Ca. 19 cm = 6 Ca. 13 cm = 2      Ca. 21 cm = 8      Ca. 27 cm = 18 Ca. 17 cm = 4      Ca. 24 cm = 12      Ca. 31 cm = 24 Bei Töpfen mit einem Durchmesser ab 35cm empfehlen wir die Verwendung von Schädlingsfrei Careo Konzentrat oder Combi-Granulat.
Zierpflanzenkulturen in Hydrokultur (Unter Glas, Büroräume, Wohnräume)	Blattläuse, Weiße Fliege (Mottenschildlaus), Schildläuse	1 Stäbchen pro Liter Substrat Stäbchen in Substrat stecken.

Max. 3 Anwendungen im Abstand von 56 Tagen je Kultur und Vegetationsperiode. Anwendung bei Befallsbeginn oder kurz nach Befall. Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Jahr. Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildung vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Insecticide Resistance Action Committee (IARC): Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): 4A.

Bei vorhandenem Befall setzt die sichtbare Wirkung gegen Blattläuse bereits nach 1-3 Tagen, gegen Weiße Fliege nach 5-6 Tagen ein. In Abhängigkeit von der behandelten Pflanzenart beginnt die sichtbare Wirkung gegen andere Schädlinge nach ca. 2 Wochen. Aus diesem Grund sollten Celaflor Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen bereits bei beginnendem Befall angewandt werden. Celaflor Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen enthalten 10% Stickstoff, 6% Phosphat, 7% Kalium, bei salzempfindlichen Pflanzen über die Dauer von 8-10 Wochen auf zusätzliche Düngung verzichten. Bei zusätzlicher Düngung könnten Pflanzenschäden durch Überdüngung auftreten. Celaflor Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen sind auch bei mehrmaliger Anwendung gut pflanzenverträglich. Petunien und Surfinien können auf die Behandlung empfindlich reagieren, bitte die Empfindlichkeit in Vorversuchen ermitteln.



Celaflor Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen ganz in die Erde stecken.



Der Wirkstoff gelangt über Wurzeln und Saftstrom in die Blätter und Blüten.



Der Wirkstoff bekämpft Blattläuse und andere saugende Schädlinge.

Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen, Pfl.Reg.Nr. 2863

**Wirkstoff:** 40 g/kg (4,0 Gew.-%) Acetamiprid  
Insektizid – Pflanzenstäbchen – Fertigpräparat

**Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.**

**Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

**Weiter Hinweise:**

**Vorsicht Pflanzenschutzmittel!**

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

**Zulassungsinhaber, für die Endkennzeichnung verantwortlich und Vertrieber:**

**Scotts Celaflor** Handelsgesellschaft m.b.H.  
Franz-Brötner Straße 11-13  
A-5071 Wals-Siezenheim  
Tel.: 0662/453713-0, www.celaflor.at



**Erste Hilfe:** Nach längerem Hautkontakt mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen, bei andauernder Reizung Arzt konsultieren. Bei Verschlucken Betroffenen ruhig stellen und sofort Arzt aufsuchen. Vergiftungsinformationszentrale: 01/4 06 43 43

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern.

Chargennr./Herstellungsdatum: siehe Aufdruck



**Entsorgung:**

Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll, über das WC oder die Kanalisation entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben.

CR2561-CLP (35)

**Inhalt: 20 Stäbchen  
25g netto**