



BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS

La gamme KB UAB* est conçue pour les jardiniers qui recherchent un équilibre entre protection efficace de leurs plantes et utilisation raisonnée des traitements. Les produits KB UAB* trouvent leur origine dans les plantes, les minéraux et les organismes vivants, et ont fait la preuve de leur efficacité lors d'essais.

*Utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement (CE) n°834/2007

Maladie des arbres Mildiou sur pomme de terre/tomate

QUAND L'UTILISER ?

J F M A M J J A S O N D

• Traiter un jour sans pluie, ni vent.

COMMENT L'UTILISER ?

1. Verser la dose indiquée dans un pulvérisateur avec un peu d'eau. 2. Bien refermer le sachet. 3. Agiter, puis compléter avec la dose d'eau nécessaire. 4. Agiter de nouveau pour obtenir un mélange homogène. 5. Pulvériser en mouillant l'ensemble du feuillage et des fruits.

TABLEAU DES USAGES :

Doseur graduation 20 = 20 g

Cultures	Maladies - Doses recommandées	1 dose de 20 g pour X L d'eau	Conditions d'application	Délai avant récolte (jours)
Cerisier	Bactérioses, Coryneum (maladie criblée) et polystigma - 12,5 g/l	1,6 L	- 2 à 3 traitements à la chute des feuilles à 10 jours d'intervalle. - Traiter également au gonflement des bourgeons si besoin.	30
Prunier	Bactérioses - 12,5 g/l	1,6 L	- 2 à 3 traitements à la chute des feuilles à 10 jours d'intervalle. - Traiter également au gonflement des bourgeons si besoin.	30
Pêcher	Cloque(s) - 25 g/l	0,8 L	- Traitement à la chute des feuilles + traitement préventif au gonflement des bourgeons (avant débourrement). - 4 traitements à la chute des feuilles à 10 jours d'intervalle.	30
	Dépérissement bactérien, bactérioses - 6,25 g/l	3,2 L		
	Coryneum et polystigma - 12,5 g/l	1,6 L		
Pommier	Chancre européen - 6,25 g/l	3,2 L	- 2 traitements à la chute des feuilles à 3 semaines d'intervalle puis 1 traitement au gonflement des bourgeons. - A la chute des feuilles. Au gonflement des bourgeons.	
	Tavelure(s), bactérioses - 12,5 g/l	1,6 L		
Poirier, Cognassier, Nashi	Chancre européen - 25 g/l	0,8 L	- 2 traitements à la chute des feuilles à 10 jours d'intervalle puis 1 traitement au gonflement des bourgeons. - A la chute des feuilles. Au gonflement des bourgeons.	
Abricotier	Bactérioses - 12,5 g/l	1,6 L	- 2 à 3 traitements à la chute des feuilles à 10 jours d'intervalle. - Traiter également au gonflement des bourgeons si besoin.	30
Fruits à coque (dont noisetier et noyer)	Bactérioses - 12,5 g/l	1,6 L	- 2 à 3 traitements à la chute des feuilles ainsi qu'au gonflement des bourgeons. Traiter tous les 15 jours dès l'apparition des premières feuilles jusqu'à la fin de la floraison.	
Olivier	Bactérioses, maladie de l'oeil de paon - 12,5 g/l	1,6 L	- 1 à 2 traitements en mars/avril lors de la formation des grappes florales. - 1 à 2 traitements en octobre/novembre.	14
Vigne	Mildiou(s) - 3,75 g/10m ²	5,3 L	- En pépinière, traiter tous les 10/15 jours de la fermeture de la grappe aux vendanges. Continuer le traitement jusqu'à novembre si forte infestation. Traiter au débourrement et immédiatement après les vendanges	21
	Bactérioses - 20 g/10m ²	1 L		
Pomme de terre	Mildiou(s) - 25 g/10m ²	0,8 L	- Traiter préventivement dès le début de la floraison et pendant les périodes à risques (chaleur + humidité). - Traiter dès le début de la végétation tous les 10 à 15 jours jusqu'à la floraison puis après la nouaison.	7
	Mildiou(s), bactérioses 20 g/10m ²	1 L	- Traitement à l'écartement des plants et juste avant la plantation, puis tous les 10 à 15 jours.	
Choux	Bactérioses 12,5 g/10m ²	1,6 L	- En pépinière, traiter tous les 10 à 12 jours du stade 2-3 feuilles jusqu'à l'arrachage des plants.	5
Fraisier	Bactérioses, maladies des taches brunes - 12,5 g/10m ²	1,6 L	- Traitement par trempage des plants au moment de la plantation.	14
Melon	Bactérioses - 4 g/10m ²	5 L	- Traitement dès la reprise des plants puis en fin d'été si des symptômes apparaissent.	7

CR4087 (60)