

COCHENILLES EXPRESS

Rapidinsect spray

Utilisable en intérieur comme en extérieur (jardin, balcon...). Cochenilles Express de Fertiligène est à base d'huile de colza et de pyréthre (extrait d'un chrysanthème). Il est **Utilisable en Agriculture Biologique*** et **élimine rapidement tous les types de cochenilles** : boucliers, carapaces, farineuses et à tous les stades (œufs, larves et adultes). Il est également efficace contre les principaux insectes du jardin : pucerons, mouches blanches, araignées rouges, cicadelles et ravageurs divers.

Nom homologué : RAPIDINSECT SPRAY. **AMM n°** 2190808 de Evergreen Garden Care France SAS (69). **Emploi autorisé dans les jardins.**
Composition : Huile de colza 10 g/l (1% p/p), Pyréthrines 0,1 g/l (0,01 % p/p).
Formulation : Liquide prêt à l'emploi. **Dose :** 1L/10 m². **Type d'action :** insecticide, acaricide de contact. Usages en traitement des parties aériennes :

Cultures (extérieur et sous abri)	Organismes nuisibles	Intervalle entre traitements, nombre d'applications
Arbres et arbustes	Acarions et Aleurodes, Pucerons, Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages, Cochenilles, ravageurs divers.	7 jours 2/an
Cultures florales et plantes vertes	Acarions, Phytomyces et Tarsomènes, Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages, Cicadelles, Cochenilles, Pucerons, Aleurodes, ravageurs divers.	7 jours 2/an
Rosiers	Acarions, Pucerons, Chenilles phytophages, Cochenilles.	7 jours 2/an
Plantes d'intérieur et balcon	Chenilles phytophages, Cochenilles, Pucerons, ravageurs divers.	7 jours 2/an

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EURL200 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine ou l'environnement. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Délai de rentrée : attendre le séchage complet de la zone traitée. Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons...) ou auxiliaires (coccinelles). Ne pas rejeter dans l'évier, le caniveau, ou tout autre point d'eau les fonds de bidon non utilisés. Éliminer les produits non utilisés et les emballages vides dans une déchèterie, conformément à la réglementation locale.
En cas d'urgence, appeler le 15, le 112 ou un centre anti-poison.

QUAND L'UTILISER ?

J F M A M J J A S O N D

- D'avril à septembre, en dessous de 25°C.
- Traiter dès l'apparition des insectes ou des premiers dégâts.
- En cas de forte infestation, renouveler après 7 jours.

COMMENT L'UTILISER ?

- Appliquer tôt le matin ou le soir.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Appuyer sur le dessus de la tête du pulvérisateur pour débloquer l'embout et le faire pivoter en position jet large.
- Pulvériser en mouillant bien tout le feuillage et les rameaux y compris le dessous des feuilles.
- Après utilisation, remettre l'embout sur STOP.
- 2 applications maximum par an.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Traiter un jour sans pluie ni vent.
- Pulvériser de préférence tôt le matin ou en début de soirée.
- Ne pas traiter sur des plantes stressées par la sécheresse.
- Ne pas traiter par forte chaleur (max 25°C) ou en cas de fort ensoleillement prévu dans la journée. Ombrer les plantes si nécessaire après le traitement.
- Éviter les projections sur les murs et les matériaux.
- Se laver les mains après utilisation.
- Ne pas réutiliser les emballages vides.
- Ne pas stocker le produit dans un local où la température peut dépasser 40°C.

*Conformément à la réglementation européenne en vigueur.

Evergreen Garden Care France SAS
 4, allée des Séquoias
 69760 LIMONEST

0 805 090 036

Service & appel gratuits

N° de lot / date de fab. : voir sur l'emballage

FCOC700
 EMB 27108
 VOLUME NET

700 mL



3 121970 172492