

## ACTION CHOC

AFOURMISG de FERTILIGÈNE contient un agent actif insecticide qui agit par contact et par ingestion sur les fourmis. Il est efficace à très faible dose.

## ACTION RADICALE

Les premiers effets sont visibles en 24 heures.

## BIEN UTILISER POUR PLUS D'EFFICACITÉ

- Traiter dès l'apparition des fourmis indésirables.
- S'utilise sur les terrasses ou autour des maisons, au pied des murs, sur les dallages.

## COMMENT L'UTILISER ?

20g de micro-granulés (2ème ligne du capot doseur) pour 1L d'eau.

- 1 Porter des gants. Tourner le couvercle sur la position "PRESS" et enfoncer l'opercule plastique.
- 2 Diluer la dose indiquée de micro-granulés dans un arrosoir avec un peu d'eau, puis finir de remplir l'arrosoir avec le volume d'eau nécessaire.
- 3 Agiter pour obtenir un mélange homogène.
- 4 Arroser abondamment sur les nids (0,5 à 2 litres par nid) ainsi que les principaux lieux de passage à raison de 1 litre par m<sup>2</sup>.

## FERTILIGÈNE VOUS CONSEILLE

Pour un emploi à l'intérieur des habitations, FERTILIGÈNE vous conseille d'utiliser un anti-fourmis en boîte ou tube appât.

Evergreen Garden Care France SAS  
21 chemin de la Sauvegarde, 69130 ECULLY  
[www.lapausejardin.fr](http://www.lapausejardin.fr)

0 805 090 036

Service & appel gratuits



Fabriqué en France

FIPRON25

MASSE NETTE

250g



3 121970 173819 >

Nom commercial  
N° d'AMM  
Composition  
Type de produit  
Organisme  
Usages et doses  
Conditions d'emploi  
Pour une plus grande efficacité  
Type d'application



ATTENTION

### PRÉCAUTIONS

- En cas d'usage à l'intérieur des habitations, éviter le contact avec les fourmis. - Éviter de laisser le produit à l'entrée des habitations. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les enfants. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les animaux domestiques. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les animaux sauvages. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les oiseaux. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les insectes. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les poissons. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les reptiles. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les amphibiens. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les mollusques. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les annélides. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les champignons. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les bactéries. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les virus. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les parasites. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les champignons. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les bactéries. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les virus. - Éviter de laisser le produit dans des endroits où il pourrait être ingéré par les parasites.