

Fertiligène

TERREAU PLANTES EN POTS BALCON & TERRASSE

Le TERREAU PLANTES EN POTS, BALCON & TERRASSE est particulièrement adapté pour la plantation de végétaux sur vos balcons, terrasses tels que les buis, conifères, bambous, dipladénias, jasmins, chèvrefeuilles, clématites, rosiers, lauriers roses, oliviers, citronniers et autres arbustes et fleurs en pot. Ce terreau est prêt à l'emploi.

Ce terreau contient un **MÉLANGE UNIQUE** et **PERFORMANT** :

- Les matières végétales 100% naturelles aèrent le terreau et évitent ainsi l'asphyxie des racines.
- Les fibres de coco favorisent la rétention en eau pour diviser par 2 le nombre d'arrosages de vos plantations.

→ L'alliance de ces composants garantit un équilibre optimal entre l'air et l'eau pour des racines fortes et de belles plantes.

POUR UN BON USAGE

Quand ?

Au Printemps et à l'Automne.

 Période idéale


J F M A M J J A S O N D

Ne jamais planter en période de gel.

Le port de gants de jardinage est recommandé lors de l'utilisation.

La plantation ou le rempotage

- 1 Choisir un contenant de dimensions suffisantes pour la plante.
- 2 Disposer un lit de graviers ou de billes d'argile épais de 5 cm. Recouvrir d'une couche de TERREAU PLANTES EN POTS, BALCON & TERRASSE de quelques cm.
- 3 Placer les plantes** au centre du pot. Compléter avec le terreau jusqu'à 2-3 cm de la partie supérieure tout en tassant légèrement. Arroser abondamment.



Le surfacage

Si les pots sont trop lourds ou pour éviter de repoter, pratiquer le surfacage.

- 1 Enlever en surface un peu de terreau vieux et usagé et le remplacer par 3 à 4 cm de terreau TERREAU PLANTES EN POTS, BALCON & TERRASSE frais. Griffer superficiellement pour incorporer le nouveau terreau.



FertiCONSEIL

Quand fertiliser ?


Commencer la fertilisation 6 semaines après la plantation à raison d'une fertilisation par an avec un engrais enrobé Osmocote Plantes en Pots ou Spécial Plantation ou 3 fois par an avec un engrais classique.

Comment arroser ?

Arroser 1 à 2 fois par semaine en fonction des besoins de la plante.

Combien de plantations ?

- 1 pot carré de 35 x 35 x 35 cm
- ou 1 pot rond diamètre 37 cm
- compter 2 sacs pour 1 pot de 43 cm de côté



T Les Tourbes retiennent l'eau, fixent et restituent les éléments fertilisants nécessaires à la croissance des plantes.

AM Avec Agent Mouillant et Fibre de Coco : rétention en eau et réhumidification optimisées.

D La Dolomie contient de la magnésie, élément très important dans la plupart des fonctions vitales telles que la photosynthèse ou la fixation des pigments responsables de la couleur de la plante.

MV Les Matières Végétales en mélange telles les écorces ou la fibre de bois facilitent l'aération du sol et donc l'enracinement.

SUPPORT DE CULTURE NF-U 44-551

Terreau avec engrais et mouillant**
Mélange de tourbe blonde de sphagnum et tourbe de sphagnum, matières végétales en mélange, fibres de coco, terre végétale, dolomie.

- matière sèche : 37% en masse de produit brut
- matière organique : 67% en masse de produit sec
- pH (H₂O) : 6,2
- conductivité : 33 mS/m
- Capacité de rétention pour l'eau : 80% en volume.
- Mouillant : 100 ml/m³ d'AquaMix* (AMM n° 9810015 de Fertil 92) à base de polypropylène glycol et dobanol.
- ENGRAIS CE, mélange d'engrais NP et NPK.
- Azote (N) : 380 g/m³
- Anhydride phosphorique (P₂O₅) : 170 g/m³
- Oxyde de potassium (K₂O) : 170 g/m³

** En raison de la présence de l'agent mouillant dans sa composition, ce terreau ne doit pas être utilisé pour la production de denrées alimentaires.

PRODUIT RÉSERVÉ AUX JARDINS AMATEURS

Site 1 : EMB 13 078 - Site 2 : EMB 49 378 - Site 3 : EMB 59 291 - Site 4 : EMB 38 014

Questions
et
conseils

LA PAUSE
JARDIN.FR

0 805 090 036 Service & support
gratuits

Scotts®

Scotts France SAS
21, chemin de la Sauvegarde
69130 ECULLY



PENSEZ
AU TRI !

ENSEMBLE
RÉDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

SAC
PLASTIQUE
À JETER

CONDONE PODIUM WATER LOCALMENT - WWW.CONDONESSETR.FR

FPLP40

BG610610

VOLUME

40 L

MASSE NETTE

9,6 Kg



3 121970 168600 >

** En raison de la présence de l'agent mouillant dans sa composition, ce terreau ne doit pas être utilisé pour la production de denrées alimentaires.