

À base d'huile végétale de colza, il est **utilisable en agriculture biologique'** et élimine efficacement tous types de pucerons (noirs verts...). Action physique : enrobe l'insecte et l'asphyxie..

COMMENT L'UTILISER?

- L = 10 m²
 Bien agiter le produit avant emploi.
 Appuyer sur le dessus de la tête du pulvérisateur pour débloquer l'embout et le faire pivoter en position jet large
 Pulvériser en mouillant bien tout le feuillage et les rameaux y compris le dessous des feuilles.
 Après utilisation , remettre l'embout sur STOP.
 Effectuer au maximum 3 applications par an.

Hom homologué: NATUREN ERADIGUN. AMM nº 2110149 de Scotts France SAS (69), Emploi autorisé dans les jardins. Composition: 16,9 g/l (1,7% p/p) d'huile de cotza. Formulation: Liquide prêt à l'emploi. Usages en traitement des parties aériennes et dose homologuée: 11/10m² - Arbres et arbustes: acariens et phytoptes (acariens), cochenilles, pucerons - Futures florales et plantes vertes: acariens, phytoptes et tarsonèmes, aleurodes, cochenilles, pucerons - Plantes d'intérieur et balcons: ravageurs divers - Rosier: acariens, aleurodes, cochenilles, pucerons - Cuttures légumières: acariens, pucerons - Pecher: acariens, aleurodes, cochenilles, pucerons - Pomme de terre: pucerons - Pommier (dont poirre, cognassier): acariens et phytoptes (acariens), cochenilles, pucerons - Prunier: pucerons - Tomate: aleurodes. Type d'action: insecticide de contact. EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. • P101: En cas de consultation d'un médeoin, garder à disposition er récipient ou l'étiquette. • P102: Tenir hors de portée des enfants. • P103: Lire l'étiquette avant utilisation. • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. • 4041: Stocker hors gel. • P501: Eliminer le contenur/écipient dans une déchetterie ou par un organisme agréé. • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. • Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau: ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en pente. • Attention ce produit peut porter atteinte à la taune auxillaire. • Ne pas traiter en présence d'abeilles. Ne pas appliquer sur plantes en fleurs.

QUAND L'UTILISER?

J F M A M J J A S O N D

- De février à octobre.
 Traiter dès l'apparition des insectes ou des premiers dégâts.
 En cas de forte infestation renouveler après 7 à 14 jours.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Traiter un jour sans pluie ni vent. • Ne pas traiter par forte chaleur (max 25°C) ou en cas de fort ensoleillement prévu dans la journée. • Ne pas traiter les plantes sensibles aux huiles telles que plantes à feurs et feuillages délicats : Brugmansia, Chrysanthemum, Cyclamen, Poinsettia, Hedera, Kalanche, poivon, Primula, fougères, Saintpaulia, Schefflera, Vicia, Zantedeschia, hortensias, misères, Coleus, Begonia, Hypoestes, Orchidées. • Éviter de traiter les conifères de couleur bleue. • Ne pas traiter sur des plantes stressées par la sécheresse. • Ombrer les plantes si nécessaire après le traitement. • Utiliser ce produit seul et attendre 10 jours avant de traiter avec un produit à base de soufre ou de cuivre. • Respecter un délai avant récotte (DAR) de 2 jours après le dernier traitement. Délai de rentrée : 6 heures. • Éviter les projections sur les murs et matériaux. • Ne pas réutiliser les emballages vides. En cas d'urgence, appeler le 15 ou un centre anti-polson.

0 805 090 036 Service & appel gratuits Scotts

Scotts France SAS 21, chemin de la Sauvegarde 69130 ECULLY





