

COMMENT L'UTILISER ?

- Verser le produit dans un pulvérisateur avec un peu d'eau.
- Bien refermer le sachet.
- Agiter, puis compléter avec la dose d'eau nécessaire.
- Agiter de nouveau pour obtenir un mélange homogène. Traiter la partie supérieure et inférieure des feuilles.

QUAND L'UTILISER ?

J F M A M J J A S O N D

- Éviter de traiter par forte chaleur (>25°C), ni sur fortes rosées, vous risqueriez de brûler vos végétaux.
- Traiter un jour sans pluie, ni vent.

TABLEAU DES USAGES Microthiol Spécial Jardin

1 DOSEUR PLEIN = 20 G

Culture *Traitement des parties aériennes	Maladie	Dose : 1 doseur pour X L d'eau	Nbr max d'application par an	Délai avant récolte (jours)
Vigne	Erinose	1 dose / 1 L (20 g/10 m ²)	1	3
	Oïdium(s)	1 dose / 2 L (12,5 g/10 m ²)	8	3
	Acariens	1 dose / 1 L (20 g/10 m ²)	1	3
	Excoriose	1 dose / 2 L (12,5 g/10 m ²)	2	3
Rosier	Oïdium(s)	1 dose / 3 L (7,5 g/10 m ²)	8	3
Fruits à coque	Acariens (acariens de bourgeons) et Phytopes	1 dose / 3 L (7,5 g/10 m ²)	2	3
Pommier	Action sur la qualité des fruits (rugosité)	1 dose / 3 L (7,5 g/10 m ²)	8	3
	Tavelure(s)			
Pommier, Pêcher, Melon	Oïdium(s)	1 dose / 3 L (7,5 g/10 m ²)	8	3
Betterave potagère, Épinard (uniquement sur feuilles de bettes)	Oïdium(s)	1 dose / 3 L (7,5 g/10 m ²)	2	5
Tomate	Acariens (acarirose bronzée)	1 dose / 3 L (7,5 g/10 m ²)	2	3