

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire et respecter les usages, délais avant récolte, intervalles entre 2 applications et le nombre minimal et maximal d'applications. En cas de consultation d'un médecin garder l'étiquette. Stocker dans l'emballage d'origine, et hors de la portée des enfants. Ne pas réutiliser l'emballage. Se laver les mains après utilisation.

Composition : 100% préle (Equisetum arvense L.) : substance de base autorisée selon le Règlement CE n°107/2009 et le document SANCO/12386/2013.

Questions et conseils
LA PAUSE JARDIN
0 805 090 036 Services à appel gratuits

Scotts France SAS
21, Chemin de la Sauvagnette
69130 BECCELLE



Poids net :
50g
(5 sachets de 10g)

NPPELE



Fabriqué en France

PENSEZ AU TRI !
SACHET PLASTIQUE À JETER
ETUI CARTON À RECYCLER

Quand l'utiliser ?

J F M A M J J A S O N D

Appliquer hors période de gel. Ne pas utiliser en cas de fortes chaleurs.

Comment l'utiliser ?

1/ Faire macérer un sachet dans 0,5L d'eau pendant 30 min.

2/ Faire ensuite bouillir la macération pendant 45 min.

3/ Laisser refroidir, puis retirer le sachet.

4/ Diluer ensuite la décoction dans 4,5L d'eau.

5/ Pulvériser directement sur les parties aériennes des plantes.

6/ Utiliser dans les 24h après préparation.

Pour éviter tout effet indésirable, faire un essai préalable sur une petite partie de la plante avant de généraliser le traitement.



Cultures	Maladies	Surface traitée	Délai avant récolte (jours)	Intervalle entre 2 applications (jours)	Nombre mini/maxi d'application	Stade d'application	
						Début	Fin
Pommiers, cognassiers, pruniers	Oïdium, tavelure	1L/10m ²	-	7	2 à 6	Début de la floraison	Fin de la floraison
Pêchers	Cloque du pêcher	1L/10m ²	-	7	2 à 6		
Vignes	Mildiou, oïdium	0,3L/10m ²	-	7	6	Apparition des premières feuilles	Crappes bien développées
Concombres (sous serre)	Oïdium, pythium	0,3L/10m ²	15	4	2	9 feuilles sur tige principale	9 pousses latérales
Tomates	Alternariose, septoriose	0,3L/10m ²	15	14	2	Début de la floraison	Fin de la floraison