

Sporządzanie cieczy użytkowej

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika z wodą i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Po pracy aparatę dokładnie wymyć.

Przechowywanie

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej 5-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności

Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności. W przypadku przedostania się środka do oczu przemyć je wodą. Używać odzieży ochronnej a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce.

Produkt powstał w procesie kontrolowanej fermentacji liści pokrzywy zgodnie z dokumentem SANTE/11809/2016 z 24 stycznia 2017

Ogród potrzebuje miłości i SUBSTRALA 



Podmiot wprowadzający produkt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. 04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji
Data produkcji i nr partii: 03/2018

Masa netto: **1 kg**



POKRZYWA

Kompleksowa Ochrona



BIO

**100%
NATURALNE**

 Zwalcza insekty i choroby

1L

Zakres stosowania

Ekstrakt z pokrzywy przeznaczony jest do stosowania w uprawach roślin ozdobnych i warzyw w warunkach polowych i pod osłonami.

Wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie insektów oraz chorób grzybowych.

DAWKA PODSTAWOWA

200 ml środka w 800 ml wody

Stosowanie środka

- ☛ **Drzewa owocowe (jabłoń, śliwa, wiśnia, brzoskwinia), czerwona porzeczka:** Mszyca brzoskwińowo-ziemniaczana, mszyca różano-szczeciowa, wełnowiec, brunatna plamistość liści, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mokra zgnilizna
 - ☛ **Warzywa liściaste (sałata, kapusta), fasola, ogórek:** mszyca, alternaria, mączniak
 - ☛ **Ziemniak:** mszyca ziemniaczana, zaraza ziemniaczana
 - ☛ **Winośli:** przedziorek chmielowiec, przedziorki, mączniak rzekomy winośli
 - ☛ **Rośliny ozdobne (róża, tawuła):** mszyce
- Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 20%**

Termin stosowania: wiosna - lato po pojawieniu się szkodnika lub choroby

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**
Odstęp między opryskami: minimum 7 dni,
zalecane 15 dni
Okres karencji (zbiór po oprysku): 7 dni

1 L na 4 L wody