



Nawóz do ROŚLIN ZIELONYCH przeciwko chlorozie CIEMNA ZIELEŃ

KONCENTRAT

Dawka podstawowa: 5 ml w 1 L wody

Specjalistyczny nawóz płynny przeznaczony do wszystkich gatunków roślin zielonych z początkowymi objawami niedoboru żelaza (chloroza). Skutki choroby są eliminowane dzięki specjalnie dobranej konfiguracji składników pokarmowych, uzupełniających niedobory przyswajalnego żelaza. Efektem stosowania nawozu jest lepsza zdrowotność i kondycja roślin objawiające się zielonym wybarwieniem liści.

STOSOWANIE

1. NAWOŻENIE ZAPOBIEGAWCZE- DOGLEBOWE:

(przeciw wystąpieniu chlorozy) - roztwór 0,5% (5 ml nawozu rozpuścić w 1 L wody), roztworem podlewać rośliny co 2 - 3 tygodnie, od marca do sierpnia, w okresie zimowym co 4 - 6 tygodni.

2. NAWOŻENIE INTERWENCYJNE- DOLISTNE:

roztwór 0,2% (2 ml nawozu rozpuścić w 1 L wody), spryskiwać dokładnie górną powierzchnię liści cienką warstwą co 7 dni, do momentu ustąpienia objawów chlorozy i poprawy kondycji roślin.

UWAGA ! Przed użyciem mocno wstrząsnąć ! Nie spryskiwać w warunkach pełnego nasłonecznienia roślin, optymalna pora to wieczór. Nie spryskiwać kwiatów, roślin świeżo przesadzonych oraz roślin o miękkich, delikatnych liściach. Nie stosować w pobliżu mebli, płytek kamiennych i odzieży, środek może pozostawiać trudne do usunięcia rdzawe plamy.



NAWÓZ WE, Roztwór nawozu azotowego N 15 z żelazem (Fe). Azot (N) całkowity 15%, w tym azot (N) azotanowy 1,1%, azot (N) amonowy 1,2%, azot (N) amidowy 12,7%. Żelazo (Fe) 0,5% rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3-7.

SUBSTRAL nawóz do ROŚLIN ZIELONYCH przeciwko chlorozie
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera siarczan żelaza i Metylochloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Niebezpieczeństwo
Scotts Poland Sp. z o.o.,
ul. Ostrobramska 101A, 04-041
Warszawa, tel. (22) 465 61 80
www.SUBSTRAL.pl

Może zawierać śladowe ilości siarczanu niklu.



Nr partii na opakowaniu.



masa **1,15 kg**
netto:
objętość netto: **1 L**

