

**SUBSTRAL****Rosenspray Schädlingfrei CAREO® ECO**

Substral Rosenspray Schädlingfrei ist ein anwendungsfertiges Spritzmittel mit dem natürlichen, nachwachsenden Wirkstoff Rapsöl.

Das Nützlingsschonende Mittel wirkt gegen saugende, besonders auch gegen schwer bekämpfbare Pflanzenschädlinge wie Schildläuse, Weiße Fliege, Blattläuse oder Spinnmilben an Zierpflanzen.

Das Rosenspray wirkt in allen Schädlings-Stadien und bekämpft erwachsene Insekten, sowie Eier und Larven. Mit Sofortwirkung gegen die zugelassenen Schädlinge fürs Zimmer, Freiland und Gewächshaus sowie auf Balkonen und Terrassen.

**Rosenspray Schädlingfrei CAREO ECO**

Akarizid, Insektizid, EW: Emulsion, Öl in Wasser  
Wirkstoff: 17 g/L (1,7 Gew.-%) Rapsöl

**Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten** (siehe Innenseite des Etiketts). **Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.**

**Lagerung und Entsorgung:** Frostfrei und trocken lagern. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Behälter mit evtl. anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben. Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleich bleibende Qualität.

**Zulassungsinhaber und Vertrieb Deutschland:**

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, D-55130 Mainz  
Tel. 01805/780300 (0,14 €/Min. a. d. dt. Festnetz. Max. 0,42 €/Min.  
aus den Mobilfunknetzen.), www.substral.de




Nr. 024213-77

**Chargennummer/Herstellungsdatum:** siehe Aufdruck

2023/66320 CLP

Inhalt:  
**1 Liter e**

**Sicherheitsverschluss**

- 1 = drücken**
- 2 = drehen**



**BITTE HIER ÖFFNEN**

Anwendungsbereich	Schädlinge	
<b>Zierpflanzen</b> im Freiland, Gewächshaus, Räumen, Zimmer, Büroräumen und Balkon	Blattläuse, Weiße Fliege, Schildläuse, Spinnmilben	N
<b>Gemüse</b> im Freiland, im Gewächshaus	Blattläuse (ausg. Mehligke Kohlblattlaus), Weiße Fliege, Spinnmilben	F
<b>Kern- &amp; Steinobst</b> im Freiland	Blattläuse, Spinnmilben	F

**F:** Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. **N:** Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. Die Aufwandmengen werden nach Pflanzengröße gestaffelt: bis 50 cm: 60 ml/m<sup>2</sup>, 50 bis 125 cm: 90 ml/m<sup>2</sup>, über 125 cm: 120 ml/m<sup>2</sup> bzw. bei Kern- und Steinobst 50 ml/m<sup>2</sup>/m Kronenhöhe. Behandeln bis zur sichtbaren Benetzung.

**Hinweise zum Schutz des Anwenders**

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

**Hinweise zum Schutz der Umwelt**

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Indirekte Einträge über Hof und Straßenabläufe verhindern. Substral Rosenspray Schädlingfrei wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich (B4) eingestuft. Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen von Raubmilben (*Typhlodromus pyri*), Laufkäfern (*Poecilus cupreus*) und Florfliegen (*Chrysoperla carnea*) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

**Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen**

Gegen schwer bekämpfbare Schädlinge wie Schildläuse, Spinnmilben, Weiße Fliege sowie Blattläuse und Schildläuse an Zierpflanzen, Spinnmilben, Blattläuse (ausgen. Mehligke Kohlblattlaus) und Weiße Fliege im Gemüsebau sowie gegen Spinnmilben und Blattläuse an Kern- und Steinobst. Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen (siehe Anwendungstabelle).

**Anwendung**

**Vor Gebrauch schütteln.** Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome Schadorganismen/Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen (spritzen), auch die Blattunterseiten. Behandlung ggf. nach 5 bis 7 Tagen wiederholen, max. 3 Behandlungen für die Kultur bzw. je Jahr.

**Zusätzliche Hinweise zur Anwendung**

Substral Rosenspray Schädlingfrei besitzt keine nachhaltige Wirkung und muss deshalb bei Neubefall erneut angewandt werden. Abtropfende Spritzbrühe kann Ölflecken auf empfindlichen Oberflächen verursachen!

**Pflanzenverträglichkeit**

Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. **Deshalb darf das Mittel nicht in praller Sonne und/oder bei hohen Temperaturen (> 25°C) angewendet werden.** Blüten und junge Blätter können empfindlich reagieren, das Wachstum wird aber nicht nachhaltig gestört. Bei Orchideen nicht auf die Blüte spritzen. Folgende Zierpflanzen nicht behandeln: Weihnachtsstern, Alpenveilchen, Kalanchoe, Efeu, Usambaraveilchen und Farne.

**Erste Hilfe**

Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen und Etikett/Verpackung vorzeigen.